

Своеобразными формами гипертермии, быстро приводящими к развитию комы, являются тепловой и солнечный удары. Тепловой удар обычно развивается при значительном повышении температуры окружающей среды одновременно с увеличением [телопродукции](#) и резким ограничением теплоотдачи (работа в горячих цехах, воинский марш и т.д.). При тепловом ударе стадии полного и частичного приспособления практически отсутствуют, быстро развиваются недостаточность системы терморегуляции и коматозное состояние.

Солнечный удар возникает в результате прямого действия интенсивной солнечной радиации на голову. **Существенное значение** в патогенезе солнечного удара имеет артериальная гиперемия мозга, приводящая к повышению внутричерепного давления, сдавливанию венозных сосудов и развитию вторичного венозного застоя. Это сопровождается отёком оболочек и ткани мозга, множественными точечными кровоизлияниями и неврологическими расстройствами. Нарушения деятельности гипоталамических центров терморегуляции способствуют вторичному повышению температуры тела и общей гипертермии. Таким образом, на определённой стадии тепловой и солнечный удары по своим механизмам и проявлениям сближаются.

Интересные статьи из раздела:

- 1) [Классификация](#) амилоидоза
- 2) [Молекулярная мимикрия](#)
- 3) [Роль иммуноглобулинов I в реакциях немедленного типа](#)