Лимфомы — моноклональные опухолевые заболевания, возникающие из малигнизированной лимфатической клетки разного уровня дифференцировки до или после контакта с центральными органами лимфопоэза — тимусом, лимфатическими узлами, селезёнкой.

Все лимфомы — **злокачественные опухоли**. Принципиальное отличие от лейкозов — то, что злокачественная трансформация лимфоцита происходит не в костном мозге, а в лимфатических узлах, лимфоидной ткани органов или просто в разных органах (например, при плазмоцитоме опухолевые клетки находятся в костях). При разрастании опухоль сдавливает окружающие ткани, частое

[клиническое проявление](#)

— синдромы сдавления (например, нижней или верхней полой вены). Опухолевые клетки в крови не циркулируют. Среди лимфом выделяют болезнь Ходжкина и неходжкинские лимфомы. Практически все лимфомы способны к лейкемизации, однако трансформация лейкоза в лимфому невозможна.

Классификация гемобластозов ВОЗ основана на гистогенетическом принципе. В зависимости от комбинации цитоморфологических, иммунофенотипических, генетических и клинических признаков выделяют **следующие виды опухолей кроветворной и лимфоидной тканей**:

миелоидные;

лимфоидные;

гистиоцитарные;

опухоли, возникающие из тучных клеток.

Интересные статьи:

1) [Другие формы ревматизма](#)

2) [Восприимчивость к инфекции](#)

3) [Механизмы развития боли](#)