Недоношенный ребёнок — рождённый при сроке беременности менее 37 полных недель. Обычно недоношенные дети имеют массу менее 2500 г и рост менее 45 см. С учётом детей, рождённых с массой более 500 г, частота невынашивания достигает 60% от числа рождённых детей.

Факторы риска рождения недоношенного ребёнка:

хронические соматические и гинекологические заболевания матери;

гестозы;

эндокринопатии;

предшествующие медицинские аборты;

малый интервал между беременностями;

неблагоприятные социально-экономические условия;

врождённые пороки развития плода;

внутриутробные инфекции плода.

Заболеваемость и смертность недоношенных детей очень высока. У преждевременно родившихся новорождённых часто бывают следующие заболевания и состояния:

перинатальная асфиксия;

гипотермия;

гипогликемия;

синдром дыхательных расстройств;

бронхолёгочная дисплазия;

аномалии водно-солевого обмена;

гипербилирубинемия;

внутричерепные кровоизлияния;

некротизирующий энтероколит;

инфекционные заболевания и др.

Морфологические признаки недоношенности:

пушковое оволосение лица, плеч, спины;

мягкие ушные раковины из-за слабого развития хрящей;

недоразвитие ногтевых пластинок;

мягкие кости черепа;

у мальчиков яички не опущены в мошонку, у девочек большие половые губы не прикрывают малые;

отсутствие или недоразвитие ядер окостенения в эпифизах длинных трубчатых костей (у доношенного зрелого плода диаметр ядра окостенения нижнего эпифиза бедра достигает 5–6 мм).

Интересные статьи из раздела:

1) Опухоли из плазматических клеток

2) Патогистологические признаки болезни Ходжкина

3) Опухоли яичка