

Синдром плацентарной трансфузии (фето-фетальный трансфузионный синдром) — **осложнение многоплодной беременности**

. Синдром развивается в случаях, когда два близнеца имеют общую плаценту (монохориальная плацента), при образовании в плаценте глубоких [артериовенозных анастомозов](#)

. При этом доля плаценты одного из близнецов получает артериальную кровь из своей собственной части плаценты, а отток крови происходит в вены части плаценты, принадлежащей другому близнецу. В случае одностороннего направления таких анастомозов развивается синдром фето-фетальной трансфузии: один близнец — донор, другой — реципиент.

Близнецы значительно отличаются размерами и массой, уровнем содержания гемоглобина. У близнеца-донора возникают анемия, гипотрофия, у близнеца-реципиента — гиперволемия, полицитемия, гипертрофия сердца, отёки. Различны и объёмы амниотической жидкости, что проявляется в многоводии у близнеца-реципиента и маловодии у близнеца-донора. Синдром фето-фетальной трансфузии вызывает высокую смертность близнецов, в первую очередь, близнецов-доноров.

---

**Статьи по медицине:**

- 1) [Остеосаркома](#)
- 2) [Туберкулёзный артрит](#)
- 3) [Бронхолёгочная дисплазия](#)