

Классификация хронического гастрита, помимо этиологии и патогенеза заболевания, учитывает топографию процесса, морфологические типы гастрита, активность процесса, наличие и выраженность метаплазии эпителия.

□ По топографии различают три варианта хронического гастрита: антральный, фундальный и [пангастрит](#).

□ По морфологии выделяют поверхностный (неатрофический) и атрофический гастрит.

◇ Хронический поверхностный гастрит. Слизистая оболочка желудка обычной толщины. Покровный эпителий с дистрофическими изменениями. Собственная пластинка слизистой оболочки инфильтрирована лимфоцитами и плазматическими клетками. Инфильтрат обычно располагается в поверхностных отделах на уровне валиков. В период обострения в инфильтрате и эпителии появляются полиморфно-ядерные лейкоциты.

◇ Прогноз поверхностного гастрита благоприятный. Заболевание длится много лет, возможно обратное развитие.

◇ При *H. pylori*-ассоциированном антральном поверхностном гастрите в биоптатах и мазках-отпечатках при окраске по Гимзе выявляется *H. pylori*. После лечения антибактериальными препаратами и уничтожения бактерии

H

.

pylori


(эрадикация) в слизистой оболочке желудка происходит восстановление ультраструктуры клеток, из инфильтрата исчезают [полиморфноядерные лейкоциты](#)

.

◇ Хронический атрофический гастрит отличается от поверхностного появлением атрофии. Слизистая оболочка истончена, её рельеф сглажен. Валики укорочены, плоские, но могут быть и в виде микропапиллярных разрастаний. Ямки углублены, штопорообразные. Покровно-ямочный эпителий уплощён. Главная клиничко-морфологическая черта — не истончение слизистой оболочки, а уменьшение числа специализированных glanduloцитов, обеспечивающих секреторную функцию желудка, и замена их на более примитивные мукоциты. Последние при выраженной атрофии полностью вытесняют париетальные и главные клетки. Железы укорочены, количество их уменьшено. В собственной пластинке — поля склероза и полиморфноклеточный инфильтрат на месте бывших желёз. Помимо типичного покровно-ямочного и железистого эпителия нередко возникают очаги полной или неполной кишечной метаплазии, а также дисплазии эпителия

Хронический атрофический гастрит — заболевание, длительно текущее без регресса атрофических изменений и сопутствующей кишечной метаплазии, т.к. механизмы, препятствующие обратному развитию атрофии, обусловлены изменением фенотипа эпителиоцитов в сторону уменьшения способности к апоптозу.

Прогноз. Хронический атрофический гастрит — предраковое заболевание желудка, поскольку на фоне тяжёлой дисплазии эпителия может развиваться рак.



Хронический гастрит: а — хронический поверхностный гастрит; б — хронический атрофический гастрит с перестройкой эпителия по кишечному типу



Полезные статьи:

- 1) [Повреждение ядра](#)
- 2) [Белковая дистрофия](#)

3) Углеводная и минеральная дистрофия