

Согласно рекомендациям комитета экспертов ВОЗ, это тяжёлая дисплазия и кишечная метаплазия эпителия желудка. Кишечная метаплазия бывает полная (тонкокишечная) и неполная (толстокишечная). Только для неполной, или [толстокишечной метаплазии](#) характерны признаки клеточной атипии, свойственные дисплазии. Дисплазия, по рекомендациям Международных экспертов ВОЗ, приравнена к неоплазии, т.е. опухолевому процессу. В 2000 г. в Вене была принята согласованная Международная классификация эпителиальных неоплазий желудочно-кишечного тракта.

Согласованная Международная классификация желудочно-кишечной эпителиальной неоплазии (2000 г.)

Категория

Выраженность неоплазии

Категория 1

Отсутствие неоплазии /дисплазии

Категория 2

Неопределённая неоплазия /дисплазия

Категория 3

Неинвазивная неоплазия низкой степени (низкая степень аденомы/ дисплазии)

Категория 4

Неинвазивная неоплазия высокой степени

4.1

4.2

4.3

Аденома/ дисплазия высокой степени

Неинвазивная карцинома (карцинома in situ)

Подозрение на инвазивную карциному

Категория 5

Инвазивная неоплазия

5.1

5.2

Интрамукозная карцинома

Субмукозная или более глубокая карцинома

В этой классификации дисплазия определена как неоплазия (неоплазма — клон клеток, отличающихся от других тканей автономным ростом и соматическими мутациями), т.е. опухоль. В пятую категорию вошло такое состояние как интрамукозная карцинома, требующее срочного оперативного вмешательства. Мало того, даже неинвазивная неоплазия (категория 4) — показание к эндоскопической или хирургической резекции слизистой оболочки.

Статьи по медицине:

- 1) [Синдромы Линча](#)
- 2) [Лептоспироз , Сифилис, Туберкулез](#)
- 3) [Уратная нефропатия](#)