

Нарушение расщепления пищевых соединений до элементарных частиц, способных всасываться через стенку тонкой кишки, — синдром мальдигестии.

Расстройства полостного пищеварения возникают при нарушении [внешнесекреторной функции](#)

поджелудочной железы (панкреатическая ахилия) и жёлчевыделительной функции печени (гипо- и ахолия).

□ Синдром панкреатической ахилии — результат уменьшения проходимости протоков железы при их **обтурации, сдавлении**; развития воспалительных, опухолевых, дистрофических процессов в самой железе; инактивации ферментов поджелудочной железы; нарушенной регуляции секреции поджелудочного сока. Панкреатическая ахилия приводит к нарушению переваривания жиров (выделение с калом жира — стеаторея), белков (выделение мышечных волокон — креаторея), углеводов (выделение крахмала — амилорея). Нарушение секреции бикарбонатов поджелудочной железой ещё более затрудняет переваривание липидов вследствие инактивации липазы и преципитации жёлчных кислот.

□ Гипо- и ахолия возникают при нарушении жёлчеобразовательной функции печени или поступления жёлчи в кишечник. Они приводят к стеаторее, вторичному нарушению переваривания белков и углеводов, расстройству всасывания жирорастворимых витаминов, обесцвечиванию кала, развитию дисбактериоза из-за отсутствия бактерицидного эффекта жёлчи.

Интересные медицинские статьи:

1) [Клиника и исходы](#) гепатитов

2) [Опухоли щитовидной железы](#)

3) [Вирусный гепатит А](#)