Пороки развития жёлчных протоков: атрезия, гипоплазия, расширение протока, дивертикулы, удвоение протоков, смещение их устья.

 Атрезия жёлчных протоков — отсутствие в них просвета, может быть вызвана нарушением эмбриогенеза жёлчных протоков на стадии реканализации. Может сопровождаться аплазией и атрезией жёлчного пузыря. Наиболее характерный признак — выраженная желтуха при ахоличном стуле.
 Гипоплазия жёлчных протоков — крайне редкое заболевание, когда жёлчные протоки представляют собой тонкие тяжи с узким просветом, не обеспечивающим эвакуацию жёлчи.

 Врождённое расширение общего жёлчного протока (кистозное расширение, киста) возникает из-за отсутствия мышечной оболочки стенки протока при его сужении или перегибе в дистальной части. Осложнения: перфорация стенки кисты с развитием жёлчного перитонита, образование свищей между протоками и полыми органами.

 Дивертикулы жёлчных протоков описаны в единичных случаях.

 Удвоение жёлчных протоков редко бывает истинным, чаще место соединения правого и левого печёночных протоков смещено дистально. Протоки могут самостоятельно впадать в двенадцатиперстную кишку или соединяться в нижней трети печёночно-двенадцатиперстной связки.

Интересные статьи:

1) Бруцеллёз

2) Жёлтая лихорадка

3) Щитовидный зоб