

Гепатит — диффузное воспаление ткани печени различной этиологии, проявляющееся дистрофическими и некротическими изменениями паренхимы, воспалительной инфильтрацией стромы и паренхимы. Гепатиты бывают первичные и вторичные (развивающиеся при других заболеваниях).

- По этиологии первичные гепатиты чаще бывают вирусными, алкогольными, лекарственными, аутоиммунными. Наибольшее значение имеют вирусный и алкогольный гепатиты.
- По течению различают гепатиты острые (до 6 мес) и хронические (свыше 6 мес).

Вторичный гепатит (неспецифический реактивный) имеет чрезвычайно разнообразную этиологию: инфекция (цитомегаловирус, жёлтая лихорадка, брюшной тиф, малярия, дизентерия, туберкулёз, сепсис), интоксикация (при тиреотоксикозе, употреблении [гепатотропных ядов](#)), поражение желудочно-кишечного тракта (гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, колиты), системные заболевания и т.д.

Патологическая анатомия острого и хронического гепатитов **различна**.

Хронические гепатиты

Самая частая причина — различные виды гепатотропных вирусов. Имеют манифестное или бессимптомное течение более шести месяцев. Характерно диффузное дистрофическое и воспалительное поражение печени с гистиолимфоцитарной инфильтрацией портальных полей, фиброз междольковой и внутريدольковой стромы, гиперплазия купфферовских клеток с сохранением дольковой структуры печени.

Печень, как правило, увеличена и уплотнена. Капсула её очагово или диффузно утолщена, белесовата. Ткань печени на разрезе пёстрая.

Классификация хронического гепатита.

Современная классификация хронического гепатита рекомендована Международным конгрессом гастроэнтерологов в Лос-Анджелесе (1994 г.) и учитывает этиологию, степень активности процесса, стадию заболевания.

Интересные статьи:

1) [Проявления инфекции и осложнения](#)

2) [Другие формы ревматизма](#)

3) [Предопухолевые изменения](#)