

Вирусные гепатиты — одна из сложнейших медицинских и социальных проблем из-за их широкого распространения и неблагоприятного исхода. Часто после перенесённой острой инфекции формируется хронический гепатит (особенно при гепатите С), возможно развитие цирроза печени, кроме того, доказана связь между гепатоцеллюлярной карциномой и вирусами гепатита В, С.

В настоящее время известно пять гепатотропных вирусов, названных по буквам английского алфавита от А до Е. Ежегодно этот список дополняют, так, недавно были идентифицированы вирусы F, G, TTV, вызывающие [парентеральный гепатит](#). Кроме того, существует группа неуточнённых вирусных гепатитов, при них пока не идентифицирован ни один известный вирус. В таких случаях для обозначения заболевания используют термин гепатит ни А, ни В, ни С.

Гепатиты А и Е относят к болезням с фекально-оральным (энтеральным) механизмом передачи. Носительство и хроническое течение, как правило, не возникает.

Все вирусные гепатиты при манифестном течении имеют четыре периода:

инкубационный, от 2 до 26 нед;

продромальный (преджелтушный) с неспецифическими симптомами;

желтушный, или период развёрнутых клинических проявлений;

период реконвалесценции.

Клинико-морфологические формы острого вирусного гепатита:

циклическая желтушная, классическое проявление вирусного гепатита А;

безжелтушная, встречается в 80% случаев вирусного гепатита С и в 70% — вирусного гепатита В;

субклиническая (инапарантная);

молниеносная (фульминантная), с массивным прогрессирующим некрозом гепатоцитов;

холестатическая, с вовлечением в процесс мелких жёлчных протоков.

Интересные статьи:

- 1) [Этиология ИБС](#)
- 2) [Болезнь Гиршпрунга и мегаколон](#)
- 3) [Ишемические поражения](#)