

Механизмы передачи возбудителя:

фекально-оральный;

воздушно-капельный, или аспирационный;

трансмиссивный (передача микроорганизмов через кровь);

контактный;

смешанный механизм передачи инфекции (попадание возбудителя в организм разными путями, например, воздушно-капельным и контактным при туберкулёзе, туляремии). В зависимости от клинико-морфологических особенностей выделяют группы инфекционных болезней. Для каждой из них характерно преимущественное поражение определённых органов и систем.

- ▣ Инфекции с преимущественным поражением кожи (пиодермия, рожа, оспа, грибковые поражения и др.).
- ▣ Инфекции дыхательных путей (пневмонии, грипп, трахеиты, бронхиты).
- ▣ Инфекции пищеварительного тракта (брюшной тиф, паратифы, амёбиаз кишечника, дизентерия, сальмонеллёзы и др.).
- ▣ Инфекционные заболевания нервной системы (полиомиелит, цереброспинальный менингит, энцефалиты и др.).
- ▣ Трансмиссивные инфекции, связанные с системой крови (возвратный тиф, малярия, геморрагические лихорадки и др.).
- ▣ Инфекции с преимущественным поражением сердечно-сосудистой системы (сифилис, бруцеллёз).
- ▣ Инфекции мочеполовой системы (гонорея, паховый лимфогранулематоз, пиелонефрит).

Кроме того, выделяют группу условно-патогенных или оппортунистических (от франц. *opportunisme* — приспособляемость) инфекций, вызываемых нормальной микрофлорой человека. При снижении естественного иммунитета человека эти микроорганизмы могут вызывать инфекционные заболевания, причём без нозологической специфики,

характерной для всех других [инфекций](#) . Например, один вид микроорганизмов может вызвать воспаление разных органов и тканей или, наоборот, разные условно-патогенные микроорганизмы вызывают одинаковое воспаление в одном и том же органе.

Условно-патогенная инфекция возникает у недоношенных или ослабленных детей, у лиц с пониженным иммунитетом при тяжёлых соматических заболеваниях, после серьёзных оперативных вмешательств, применения иммунодепрессантов (гормонов, цитостатиков и т.п.) или антибиотиков широкого спектра действия. Эти и другие препараты способны изменить биологические свойства микроорганизмов — симбионтов человека.

Условно-патогенные микроорганизмы — наиболее частые возбудители внутрибольничных инфекций.

Возбудитель заболевания может попасть в организм либо из внешней среды, либо из внутренней среды организма. По этому признаку все инфекции делят на экзогенные и эндогенные.

Интересные статьи:

- 1) [Частые формы рака](#)

2) [Доброкачественные эпителиальные опухоли](#)

3) [Влияние токсических веществ и опухолей на ЦНС](#)