

Туберкулёз мочевыводящей системы может поражать любой отдел как у мужчин, так и у женщин. Он бывает острым, хроническим, с атипичными симптомами. Туберкулёз почек возникает чаще у молодых людей или в пожилом возрасте, проявляется интерстициальным туберкулёзным нефритом. Находят мелкие и крупные очаги поражения, расположенные в корковом, а при **прогрессировании процесса** — также и в мозговом веществе почки, образование полостей — каверн. Туберкулёз мочеточников и мочевого пузыря — обычно следствие распространения микобактерий с мочой. Иногда возникает стриктура мочеточников.

Туберкулёз половой системы у мужчин начинается с придатка яичка, после чего **возможен распространение**

на семенник. В большинстве случаев одновременно развиваются туберкулёзный простатит и везикулит (воспаление семенных пузырьков). Течение может быть от острого до бессимптомного. Для туберкулёзного простатита и эпидидимита характерны безболезненные узелковые уплотнения, выявляемые при объективном исследовании.

У женщин возможны туберкулёз маточных труб (сальпингит), [прогрессирующий туберкулёз](#) придатков матки (сальпингоофорит или аднексит), распространённый туберкулёз половых органов с переходом процесса из придатков на тело матки и эндометрий (туберкулёзный хронический эндометрит), туберкулёз наружных половых органов. При туберкулёзном сальпингите отмечают деформацию стенок трубы, сужение и обтурацию просвета казеозными массами, в стенке — многочисленные гранулёмы, имеющие характерное строение. Туберкулёз женских половых органов — одна из причин первичного или вторичного бесплодия.

Интересные статьи:

- 1) [Нарушения пищеварения в полости рта](#)
- 2) [Аномалии развития](#)
- 3) [Клинические признаки](#) гломерулонефрита